

# Algebra1 Intenzív verzió

## 6. gyakorlat

2013. október 15.

1. Írjuk fel az alábbi permutációk ciklusfelbontását:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 1 & 7 & 3 & 6 & 4 & 5 & 8 \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 5 & 6 & 1 & 4 & 3 & 8 & 7 \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} a & b & c & d & e \\ c & a & e & b & d \end{bmatrix};$$

$$(35)(1432)(53)(1234); \quad (123)^{-1}; \quad (54321)(243)(12345).$$

2. Bizonyítsuk be, hogy  $(12 \cdots k) = (21)(32) \cdots (k, k-1)$ , illetve hogy  $(12 \cdots k) = (1, k)(1, k-1) \cdots (12)$ .
3. Hány különböző hatványa van az  $f = (12)(34)(567)$  permutációnak? Mely  $n$  és  $k$  egész számokra lesz  $f^k = f^n$ ?
4. Bizonyítsuk be, hogy ha  $(x_1 x_2 \cdots x_k)$  egy tetszőleges ciklus az  $S_n$  csoportban, akkor  $f(x_1 x_2 \cdots x_k) f^{-1} = (f(x_1) f(x_2) \cdots f(x_k))$ .
5. Rendezhető-e a könyvek a könyvespolcon ha csak szomszédos könyvek cseréjét engedjük meg?
6. Adjuk meg az összes olyan  $f \in S_n$  permutációt, amely felcserélhető az  $(12 \cdots n)$  ciklussal.
7. Igazoljuk, hogy  $S_n$  minden eleme előáll legfeljebb  $n-1$  transzpozíció szorzataként. (\*) Éles-e ez a határ?
8. Számítsuk ki az alábbi determinánsok értékét:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}; \quad \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 5 & 9 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}; \quad \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

9. Igazoljuk, hogy ha egy komplex elemű determinánsban  $a_{ij} = \overline{a_{ji}}$  minden  $i, j$ -re, akkor a determináns értéke valós.
10. Egy (egészegyütthatós) determinánsban minden oszlopösszeg osztható 7-tel. Bizonyítsuk be, hogy a determináns értéke is osztható 7-tel.

11. Igazoljuk, hogy ha egy  $n \times n$ -es determinánsban egy  $m \times k$ -as téglalap csupa nullákból áll, és  $m + k > n$ , akkor a mátrix determinánsa nulla.
12. Számítsuk ki az alábbi determinánsok értékét:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & \cdots & n \end{vmatrix}; \quad \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

*Nehezebb feladatok*

13. a) Legyen  $K$  test,  $A \in K^{k \times k}$ ,  $B \in K^{m \times m}$ ,  $X \in K^{k \times m}$  és  $O$  az  $m \times k$ -as nullmátrix. Rakjuk össze az  $M$  mátrixot ebből a négy blokkból a következőképpen:  $M := \begin{pmatrix} A & X \\ 0 & B \end{pmatrix}$ . Igazoljuk, hogy  $\det(M) = \det(A) \det(B)$ .
- b) Legyen  $A$  és  $B$  most  $n \times n$ -es  $K$  feletti mátrix, és  $I$  az  $n \times n$ -es egységmátrix,  $O$  pedig a nullmátrix. Az  $\begin{pmatrix} A & I \\ 0 & B \end{pmatrix}$  blokkmátrixot megfelelően Gauß-eliminálva adjunk új bizonyítást a determinánsok szorzástételére.
14. Igazoljuk, hogy a vezéregyesek száma nem függ a Gauß-elimináció módjától.