

# Algebrai Számelmélet

## 4. gyakorlat

2015. október 7.

1. (2 pont) Legyen  $R$  és  $R'$  egy integritási tartomány és  $0 \notin S \subset R$  egy multiplikatívan zárt halmaz. Tegyük fel továbbá, hogy  $\varphi: R \rightarrow R'$  egy olyan gyűrűhomomorfizmus, melyre  $\varphi(S) \subseteq R'^{\times}$ . Igazoljuk, hogy ekkor  $\varphi$  egyértelműen kiterjed egy  $\tilde{\varphi}: RS^{-1} \rightarrow R'$  gyűrűhomomorfizmussá.
2. (3 pont) Legyen  $R$  egy integritási tartomány és  $0 \notin S \subset R$  egy multiplikatívan zárt halmaz. Igazoljuk, hogy  $RS^{-1}$  egy lapos  $R$ -modulus, azaz a vele vett tenzorszorzat egzakt.
3. (3 pont) Legyen  $R$  egy integritási tartomány és  $f: M \rightarrow N$  egy  $R$ -homomorfizmus az  $M, N$   $R$ -modulusok között. Igazoljuk, hogy az alábbiak ekvivalensek:
  - (i)  $f$  injektív (szürjektív);
  - (ii)  $f_{\mathfrak{p}}: M_{\mathfrak{p}} \rightarrow N_{\mathfrak{p}}$  injektív minden  $\mathfrak{p} \triangleleft R$  prímeálra;
  - (iii)  $f_{\mathfrak{m}}: M_{\mathfrak{m}} \rightarrow N_{\mathfrak{m}}$  injektív minden  $\mathfrak{m} \triangleleft R$  maximális ideálra.Itt  $M_{\mathfrak{p}} = R_{\mathfrak{p}} \otimes_R M$ ,  $M_{\mathfrak{m}} = R_{\mathfrak{m}} \otimes_R M$ ,  $N_{\mathfrak{p}} = R_{\mathfrak{p}} \otimes_R N$  és  $N_{\mathfrak{m}} = R_{\mathfrak{m}} \otimes_R N$ .
4. (3 pont) Legyen  $R$  integritási tartomány és  $0 \notin S \subset R$  egy multiplikatívan zárt halmaz. Igazoljuk, hogy ha  $RS^{-1}$  egész  $R$  felett, akkor  $RS^{-1} = R$ .
5. (3 pont) (Nakayama Lemma) Legyen  $R$  egy lokális gyűrű  $\mathfrak{m} \triangleleft R$  maximális ideállal és  $M$  egy végesen generált  $R$ -modulus. Igazoljuk, hogy ha egy  $N \leq M$  részmodulusra  $M = N + \mathfrak{m}M$ , akkor  $M = N$ .
6. (a) (4 pont) Legyen  $(\mathcal{O}, \mathfrak{m})$  egy lokális noether gyűrű. Igazoljuk, hogy  $\bigcap_{k \geq 1} \mathfrak{m}^k = 0$ .  
(b) (3 pont) Igazoljuk, hogy egy  $(\mathcal{O}, \mathfrak{m})$  noether lokális integritási tartomány pontosan akkor diszkrét értékelésgyűrű, ha  $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$  egy egyszemélyes vektortér  $\mathcal{O}/\mathfrak{m}$  felett.
7. (3 pont) Legyen  $K$  egy test és  $v: K^{\times} \rightarrow \mathbb{Z}$  egy szürjektív csoport-homomorfizmus és legyen  $v(0) = \infty$ . Tegyük fel, hogy  $v(x+y) \geq \min(v(x), v(y))$ . Igazoljuk, hogy  $\mathcal{O} := \{\alpha \in K \mid v(\alpha) \geq 0\}$  egy diszkrét értékelésgyűrű.
8. (3 pont) Igazoljuk, hogy egy noether-féle integritási tartomány pontosan diszkrét értékelésgyűrű, ha egésze zárt és egyetlen nemnulla prímeálja van.

9. (3 pont) Legyen  $\mathcal{O}$  egy Dedekind gyűrű és  $k$  egy pozitív egész. Minden  $1 \leq i \leq k$ -ra legyen  $\mathfrak{p}_i \triangleleft \mathcal{O}$  egy prímeál,  $x_i \in K$  (ahol  $K$  a hányadostest) és  $n_i \in \mathbb{Z}$ . Igazoljuk, hogy van olyan  $x \in K$ , melyre  $v_{\mathfrak{p}_i}(x - x_i) \geq n_i$  ( $i = 1, \dots, k$ ) és  $v_{\mathfrak{p}}(x) \geq 0$  minden  $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{p}_i$  príme-re.
10. (3 pont) Legyen  $K/\mathbb{Q}$  egy véges bővítés,  $\mathcal{O}_K$  az egészek gyűrűje,  $S$  pedig egy  $\mathcal{O}_K$ -beli (nemnulla) prímeálokból álló véges halmaz és  $X = \text{Spec}(\mathcal{O}_K) \setminus S$ . Igazoljuk, hogy  $Cl(\mathcal{O}_K(X))$  véges, továbbá  $\mathcal{O}_K(X)^\times \cong \mu(K) \times \mathbb{Z}^{|S|+r+s-1}$ , ahol  $r$  a valós beágyazások,  $s$  pedig a tisztán képzetes beágyazások párjainak száma.
11. (3 pont) (Newton poligon) Legyen  $\mathcal{O}$  diszkrét értékelésgyűrű  $K$  hányadostesttel és  $v: K^\times \rightarrow \mathbb{Z}$  értékeléssel. Ha  $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$  egy  $n$ -edfokú  $K$ -beli együtthatós polinom, akkor  $f$  Newton-poligonja a síkon a  $(-i, v(a_i))$  rácspontok alsó konvex burka (tehát egy  $(-n, v(a_n))$ -et  $(0, v(a_0))$ -lal összekötő konvex töröttvonal, melynek csúcsai a  $(-i, v(a_i))$  pontok közül kerülnek ki, és alatta nincs ilyen rácspont). Jelöljük továbbá  $S(f)$ -fel a Newton-poligon meredekségeinek a multihalmazát: azaz  $S(f)$  egy  $n$  elemű multihalmaz, melyben minden  $s$  racionális szám a Newton-poligon  $s$ -meredekségű részének  $x$ -tengelyre vett vetületének hossza szerinti multiplicitással szerepel. Igazoljuk, hogy  $S(fg) = S(f) \cup S(g)$ . Speciálisan ha  $f(x) \in K[x]$  Newton-poligon egyetlen szakaszból áll, melyen a két szélén kívül nincs más rácspont, akkor  $f$  irreducibilis.