Algebrai Számelmélet

7. feladatsor

beadható 2020. november 11-ig

A következő feladatok némileg egymásra épülnek. A cél itt a Fermat-sejtés első esetének igazolása reguláris prímekre.

1. (3 pont) Igazoljuk, hogy $\frac{u}{\overline{u}}$ egységgyök tetszőleges $u \in \mathcal{O}_n^\times$ egységre, ha $\mathcal{O}_n$ az n-edik körosztási test egészeinek gyűrűjét jelöli. Mutassuk meg továbbá, hogy ha $n = p^k$ valamely páratlan p prímre, akkor $\frac{u}{\overline{u}}$ egy p^k-adik egységgyök is, azaz létezik egy

$$\begin{array}{rcl} \mathcal{O}_{p^k}^\times & \to & \mu_{p^k} \\ u & \mapsto & \dfrac{u}{\overline{u}} \end{array}$$

   csoporthomomorfizmus.

2. (3 pont) Legyen p egy páratlan prímszám és jelöljük $\mathcal{O}_{p^k}$-nak a p^k-adik körosztási testet. Igazoljuk, hogy $\mathcal{O}_{p^k}^\times$-ben minden u elem felírható $u = \zeta v$ alakban, ahol ζ egy alkalmas p^k-adik egységgyök, $v \in \mathbb{Z}[\zeta] \cap \mathbb{R}$ pedig valós.

   Tegyük fel, hogy $p \nmid xyz$ olyan egész számok, melyekre $x^p + y^p = z^p$ ($2 < p$ prím).

3. (1+1 points) Modulo 9 vizsgálódva igazoljuk, hogy $p \neq 3$. Modulo 25 vizsgálódva igazoljuk, hogy $p \neq 5$.

   Legyen tehát mostantól $p > 5$ és jelöljük ζ-val egy fix primitív p-edik egységgyököt.

4. (1 point) Feltehetjük, hogy az x, y, z számok páronként relatív prímek, továbbá azt is, hogy $p \nmid x - y$.

5. (2 pont) Igazoljuk, hogy az $x+y, x+y\zeta, \ldots, x+y\zeta^{p-1}$ számok páronként relatív prímek $\mathcal{O}_p$-ben.

6. (2 pont) Igazoljuk, hogy minden $\alpha \in \mathcal{O}_p$-re $\alpha^p \in \mathbb{Z} + p\mathcal{O}_p$ (azaz van olyan $a \in \mathbb{Z}$, melyre $a - \alpha^p$ osztható p-vel).

7. (2 pont) Legyen $\alpha = a_0 + a_1\zeta + \ldots a_{p-1}\zeta^{p-1}$, ahol $a_i \in \mathbb{Z}$ ($i = 0, \ldots, p-1$) és legalább az egyik $a_i = 0$. Igazoljuk, hogy ha $\alpha \in n\mathcal{O}_p$ alkalmas $n \in \mathbb{Z}$ egész számmal, akkor $n \mid a_i$ minden $i = 0, \ldots, p-1$-re.

8. (2 pont) Ha egy számtest osztályszámát nem osztja p és egy ideál p-edik hatványa főideál, akkor az ideál maga is főideál.

9. (3 pont) Tegyük fel, hogy p nem osztja $\mathcal{O}_p$ osztályszámát. Lássuk be, hogy a fenti $x^p + y^p = z^p$ egyenletnek nincs olyan megoldása, amire $p \nmid xyz$. Segítség: alakítsuk az egyenletet $\prod_{j=0}^{p-1}(x + y\zeta^j) = (z)^p$ alakba. Mindkét oldalt bontsuk $\mathcal{O}_p$-ben prímideálok szorzatára. Vegyük észre, hogy feltételek miatt $x + \zeta^j y = u_j \alpha_j^p$ alakú, ahol $u_j \in \mathcal{O}_p^\times$ egység, $\alpha_j \in \mathcal{O}$. Most α_1-re alkalmazzuk a 6. Feladatot, u_1-re pedig a 2. Feladatot, hogy találhassunk egy olyan $r \in \mathbb{Z}$ egész számot, melyre $x + \zeta y \equiv \zeta^r va \pmod{p}$, ahol $v \in \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{Z}$. Az előző kongruenciát megkonjugálva kapjuk, hogy $p \mid x + \zeta y - \zeta^{2r} x - \zeta^{2r-1} y$. A 7. Feladat segítségével jussunk ellentmondásra.